



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการของรัฐ


เตือนภัย กินหมูดิบ

เสี่ยงติดเชื้อ “โรคไขุ่หูดับ”



สาเหตุ : เมื่อร่างกายมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสหมู
กินเนื้อหรือเลือดหมูดิบ ที่มีเชื้อ
“สเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส” ปนเปื้อนอยู่

อาการ : มีไข้ วิตเวียน ปวดศีรษะ อาเจียน
ประสาทหูอักเสบจนหูดับ ในรายที่อาการรุนแรง
อาจเสียชีวิตได้



การป้องกัน

- หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อดิบ**
หรือสุกๆดิบๆ หมูป่วยหรือตายจากโรค
- ผู้ปรุงอาหาร ผู้เลี้ยง** และผู้ชำแหละหมูที่มีบาดแผล
ต้องปิดแผลและสวมถุงมือขณะสัมผัสหมู
หากสัมผัสต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ร่วมกับ
ใส่ยาฆ่าเชื้อโรคที่แผล
- เลือกซื้อหมูจากตลาดสด**
หรือโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ
- ควรทำให้สุกด้วยอุณหภูมิ**
ตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 นาที

