

การฉีดวัคซีน COVID-19

ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรค COVID-19 มีความเสี่ยงที่โรครุนแรงกว่าคนทั่วไป ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ยังมีจำกัด การให้วัคซีนจึงควรชั่งน้ำหนักของประโยชน์และความเสี่ยง ทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน ความเสี่ยงที่จะติดโรค COVID-19 และความรุนแรงของโรค COVID-19 ก่อนการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ทุกราย
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่โรครุนแรงหากติดเชื้อ



มีโรคประจำตัว

อ้วน

ควรฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์
ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้สูง



บุคลากรทางการแพทย์

อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

คุณแม่ควรรู้



ระยะเวลาที่ควรฉีดวัคซีน
หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์



ผลข้างเคียงของวัคซีน
อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับในผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์



สตรีที่ให้นมบุตร
สตรีที่ให้นมบุตรสามารถรับการฉีดวัคซีนได้

